

Острый бронхиолит

Подборка ключевых международных клинических рекомендаций, гайдлайнов и консенсусов от ведущих врачебных обществ

Что изменилось за последние 5 лет

За последние годы международные рекомендации закрепили тактику минимально необходимого вмешательства. По документам Американской академии педиатрии (AAP), Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) диагноз ставят клинически, а рутинные бронходилататоры, системные глюкокортикоиды, антибиотики, физиотерапию грудной клетки и лабораторно-лучевое обследование при типичном течении не рекомендуют. Главный сдвиг произошёл в профилактике. Рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) 2023 года ввели пассивную иммунопрофилактику нирсевимабом для всех младенцев и материнскую вакцинацию во время беременности, сместив защиту от узких групп риска эпохи паливизумаба к универсальной. Обновление австралоазиатских рекомендаций PREDICT 2025 года уточнило целевые уровни сатурации и роль увлажнённой высокопоточной оксигенации.

Гайдлайны и консенсусы

#	Статья	PMID	Источник	Дата	Доступ
1	Клинические рекомендации: диагностика, ведение и профилактика бронхиолита	25349312	Pediatrics	01.11.2014	Открытая
2	Бронхиолит у детей: диагностика и ведение	34464037	Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE)	09.08.2021	Открытая
3	Сводные рекомендации ВОЗ по ведению распространённых болезней детского возраста: ведение бронхиальной астмы у детей и подростков и бронхиолита	42160651	Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)	2026	Открытая

#	Статья	PMID	Источник	Дата	Доступ
	у младенцев и детей раннего возраста				
4	Австралоазиатские рекомендации по бронхиолиту: обновление 2025 года	40685806	Journal of Paediatrics and Child Health	20.07.2025	Открытая
5	Бронхиолит: рекомендации по диагностике, наблюдению и ведению детей в возрасте от 1 до 24 месяцев	25414585	Paediatrics & Child Health	01.11.2014	Открытая
6	Применение нирсевимаба для профилактики заболеваний, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом, у младенцев и детей раннего возраста: рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP), США, 2023	37616235	MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report	25.08.2023	Открытая
7	Применение вакцины Pfizer против респираторно-синцитиального вируса во время беременности для профилактики заболеваний нижних дыхательных путей, связанных с респираторно-синцитиальным вирусом, у младенцев: рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP), США, 2023	37824423	MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report	13.10.2023	Открытая
8	Клинические рекомендации Американской ассоциации респираторной помощи (AARC): ведение детей, получающих кислородную терапию, в условиях стационарной помощи	33790048	Respiratory Care	31.03.2021	Открытая

#	Статья	PMID	Источник	Дата	Доступ
9	Клинические рекомендации: ведение тяжёлого бронхиолита у младенцев до 12 месяцев в отделении детской интенсивной терапии	36592200	Intensive Care Medicine	02.01.2023	Закрытая

1. Клинические рекомендации: диагностика, ведение и профилактика бронхиолита

Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis.

Журнал: Pediatrics | **Дата:** 01.11.2014 | **Доступ:** Открытая

Определяет тактику ведения бронхиолита: клиническая диагностика без рутинной визуализации и анализов, отказ от бронходилататоров, глюкокортикоидов и антибиотиков, пороги для кислородотерапии и гидратации, меры профилактики.

Оригинал

Аннотация на русском

2. Бронхиолит у детей: диагностика и ведение

Bronchiolitis in children: diagnosis and management

Издатель: Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE) | **Дата:** 09.08.2021 | **Доступ:** Открытая

Определяет показания к направлению и госпитализации, целевые уровни сатурации для выбора между наблюдением дома и в стационаре и перечень поддерживающих вмешательств. Пересмотр 2021 года уточнил именно пороговые значения сатурации.

Оригинал

Аннотация на русском

3. Сводные рекомендации ВОЗ по ведению распространённых болезней детского возраста: ведение бронхиальной астмы у детей и подростков и бронхиолита у младенцев и детей раннего возраста

WHO consolidated guidelines for the management of common childhood illness: Management of asthma in children and adolescents and bronchiolitis in infants and young children

Издатель: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) | **Дата:** 2026 | **Доступ:** Открытая

Описывает клиническую диагностику бронхиолита, показания к госпитализации, кислородотерапию и поддерживающее лечение на разных уровнях системы здравоохранения. Опирается на GRADE и учитывает условия ограниченных ресурсов.

Оригинал

Аннотация на русском

4. Австралоазиатские рекомендации по бронхиолиту: обновление 2025 года

Australasian Bronchiolitis Guideline: 2025 Update.

Журнал: Journal of Paediatrics and Child Health | **Дата:** 20.07.2025 | **Доступ:** Открытая

Обновляет клинические признаки и факторы риска тяжёлого течения, целевые уровни сатурации, тактику при увлажнённой высокопоточной оксигенации и СРАР. Разбирает глюкокортикоиды и ингаляционный адреналин при тяжёлом бронхиолите и коинфекции SARS-CoV-2, а также профилактику респираторно-синцитиальной инфекции у младенцев и вакцинацию матерей.

Читать в Подтеме

Оригинал

Аннотация на русском

5. Бронхиолит: рекомендации по диагностике, наблюдению и ведению детей в возрасте от 1 до 24 месяцев

Bronchiolitis: Recommendations for diagnosis, monitoring and management of children one to 24 months of age.

Журнал: Paediatrics & Child Health | **Дата:** 01.11.2014 | **Доступ:** Открытая

Бронхиолит диагностируют клинически, лабораторные исследования обычно ничего не добавляют, болезнь проходит сама и требует только поддерживающего лечения. Определяет группы высокого риска и критерии госпитализации. Заявление подготовило Канадское педиатрическое общество (CPS).

Оригинал

Аннотация на русском

6. Применение нирсевимаба для профилактики заболеваний, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом, у младенцев и детей раннего возраста: рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP), США, 2023

Use of Nirsevimab for the Prevention of Respiratory Syncytial Virus Disease Among Infants and Young Children: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices - United States, 2023.

Журнал: MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report | **Дата:** 25.08.2023 | **Доступ:** Открытая

Вводит пассивную иммунопрофилактику одной дозой моноклонального антитела для всех младенцев до 8 месяцев перед первым сезоном респираторно-синцитиального вируса и для детей 8–19 месяцев из групп высокого риска перед вторым сезоном. Определяет сроки введения относительно сезона и сочетание с материнской вакцинацией. Смещает профилактику от узких групп риска эпохи паливизумаба к универсальной защите младенцев.

Читать в Подтеме

Оригинал

Аннотация на русском



7. Применение вакцины Pfizer против респираторно-синцитиального вируса во время беременности для профилактики заболеваний нижних дыхательных путей, связанных с респираторно-синцитиальным вирусом, у младенцев: рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP), США, 2023

Use of the Pfizer Respiratory Syncytial Virus Vaccine During Pregnancy for the Prevention of Respiratory Syncytial Virus-Associated Lower Respiratory Tract Disease in Infants: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices - United States, 2023.

Журнал: MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report | **Дата:** 13.10.2023 | **Доступ:** Открытая

Рекомендует вакцинировать беременную на 32–36 неделе в сезон циркуляции вируса, чтобы материнские антитела прошли через плаценту и защитили ребёнка в первые месяцы жизни. Разбирает, как выбирать между вакцинацией матери и введением нирсевимаба ребёнку (обычно применяют что-то одно), и определяет сезонное окно введения.

Читать в Подтеме

Оригинал

Аннотация на русском

8. Клинические рекомендации Американской ассоциации респираторной помощи (AARC): ведение детей, получающих кислородную терапию, в условиях стационарной помощи

AARC Clinical Practice Guideline: Management of Pediatric Patients With Oxygen in the Acute Care Setting.

Журнал: Respiratory Care | **Дата:** 31.03.2021 | **Доступ:** Открытая

Приводит четыре рекомендации по кислородотерапии у госпитализированных детей. Высокопоточная оксигенотерапия через назальные канюли (HFNC) безопасна и эффективнее низкопоточной у младенцев со среднетяжёлым и тяжёлым бронхиолитом. Целевую SpO₂ удерживают в диапазоне 90–97%. Увлажнение при низком потоке не требуется, а кислородный колпак или палатка как замена низкопоточной подаче не рекомендованы.

Оригинал

Аннотация на русском

9. Клинические рекомендации: ведение тяжёлого бронхиолита у младенцев до 12 месяцев в отделении детской интенсивной терапии

Clinical practice guidelines: management of severe bronchiolitis in infants under 12 months old admitted to a pediatric critical care unit.

Журнал: Intensive Care Medicine | **Дата:** 02.01.2023 | **Доступ:** Закрытая

Приводит 40 рекомендаций по тяжёлому бронхиолиту в интенсивной терапии: показания к переводу в ОРИТ, мониторинг, питание и гидратацию, респираторную поддержку и вспомогательную терапию. Предлагает менее инвазивный подход, чем описанный в литературе.

[Оригинал](#)[Аннотация на русском](#)

Переведем статью из этой подборки за 1 час

Загрузите PDF, а мы сделаем полный перевод, краткий конспект и красивую инфографику.

[Попробовать бесплатно →](#)

Также в Подтеме: еженедельные литобзоры и конспекты свежих мед. статей и подкастов каждый день.