

Бактериальный вагиноз

Подборка ключевых международных клинических рекомендаций, гайдлайнов и консенсусов от ведущих врачебных обществ

Что изменилось за последние 5 лет

Главный сдвиг последних лет касается половой передачи заболевания. По данным исследования StepUp (2025) и обновлённых позиций Американской коллегии акушеров и гинекологов (ACOG, 2025) и Международного общества по изучению заболеваний вульвы и влагалища (2026), лечение полового партнёра-мужчины при рецидивирующем течении впервые получило доказательную поддержку. Рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (2021) закрепили роль молекулярных тестов рядом с классическими критериями Амсея и окраской по Граму. По заключению Рабочей группы по профилактике заболеваний США (2020), скрининг бессимптомного вагиноза у беременных без факторов риска преждевременных родов не рекомендован.

Гайдлайны и консенсусы

#	Статья	PMID	Источник	Дата	Доступ
1	Руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) по лечению инфекций, передаваемых половым путём, 2021	34292926	MMWR. Recommendations and Reports	23.07.2021	Открытая
2	Вагиниты у небеременных пациенток: практический бюллетень № 215 Американской коллегии акушеров и гинекологов (ACOG)	31856123	Obstetrics and Gynecology	01.01.2020	Закрытая
3	Рекомендации по лечению инфекций Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Candida albicans,	39116264	Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)	2024	Открытая

#	Статья	PMID	Источник	Дата	Доступ
	бактериального вагиноза и вируса папилломы человека (аногенитальные бородавки)				
4	Европейское руководство по ведению вагинальных выделений 2018 года Международного союза по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путём (IUSTI), и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)	30049258	International Journal of STD & AIDS	27.07.2018	Закрытая
5	Рекомендации Международного общества по изучению заболеваний вульвы и влагалища (ISSVD) по микроскопии нативного (влажного) вагинального мазка: методика выполнения, показания и интерпретация	33631782	Journal of Lower Genital Tract Disease	01.04.2021	Закрытая
6	Одновременное лечение полового партнёра для профилактики рецидива бактериального вагиноза: обновление клинической практики Американской коллегии акушеров и гинекологов (ACOG)	41100865	Obstetrics and Gynecology	01.12.2025	Закрытая
7	Лечение половых партнёров при бактериальном вагинозе у женщин: обновление рекомендаций Международного общества по изучению заболеваний вульвы и влагалища (ISSVD)	41741199	Sexually Transmitted Infections	25.02.2026	Закрытая
8	Скрининг бактериального вагиноза у беременных для профилактики преждевременных родов: рекомендательное	32259236	JAMA	07.04.2020	Открытая

#	Статья	PMID	Источник	Дата	Доступ
	заявление Рабочей группы по профилактике заболеваний США (USPSTF)				

1. Руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) по лечению инфекций, передаваемых половым путём, 2021

Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021.

Журнал: MMWR. Recommendations and Reports | **Дата:** 23.07.2021 | **Доступ:** Открытая

Приводит рекомендуемые и альтернативные схемы лечения бактериального вагиноза, на которые опирается большинство национальных рекомендаций. Раздел о вагинозе входит в общее руководство по инфекциям, передаваемым половым путём.

Оригинал

Аннотация на русском

2. Вагиниты у небеременных пациенток: практический бюллетень № 215 Американской коллегии акушеров и гинекологов (ACOG)

Vaginitis in Nonpregnant Patients: ACOG Practice Bulletin, Number 215.

Журнал: Obstetrics and Gynecology | **Дата:** 01.01.2020 | **Доступ:** Закрытая

Разбирает диагностику и лечение основных причин вагинита у небеременных: как отличить бактериальный вагиноз (БВ) от кандидоза и трихомониаза и какие схемы выбрать при первом эпизоде. Рецидивирующим считает БВ при трёх и более задокументированных эпизодах за год и после лечения острого эпизода предлагает супрессивный гель с метронидазолом дважды в неделю в течение 16 недель.

Оригинал

Аннотация на русском

3. Рекомендации по лечению инфекций *Trichomonas vaginalis*, *Mycoplasma genitalium*, *Candida albicans*, бактериального вагиноза и вируса папилломы человека (аногенитальные бородавки)

Recommendations for the treatment of Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Candida albicans, bacterial vaginosis and human papillomavirus (anogenital warts)

Издатель: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) | **Дата:** 2024 | **Доступ:** Открытая

Объединяет схемы лечения возбудителей патологических выделений: трихомониаз, *Mycoplasma genitalium*, кандидоз, бактериальный вагиноз и ВПЧ, с рекомендуемыми и альтернативными режимами для каждого. Раздел по БВ описывает первую линию терапии и тактику при рецидивирующем течении.

Оригинал

Аннотация на русском

4. Европейское руководство по ведению вагинальных выделений 2018 года Международного союза по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путём (IUSTI), и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

2018 European (IUSTI/WHO) International Union against sexually transmitted infections (IUSTI) World Health Organisation (WHO) guideline on the management of vaginal discharge.

Журнал: International Journal of STD & AIDS | **Дата:** 27.07.2018 | **Доступ:** Закрытая

Приводит европейский алгоритм разбора вагинальных выделений и разграничивает четыре основные причины: бактериальный вагиноз, аэробный вагинит, кандидоз и трихомониаз. Для каждой описывает диагностику и лечение.

Оригинал

Аннотация на русском

5. Рекомендации Международного общества по изучению заболеваний вульвы и влагалища (ISSVD) по микроскопии нативного (влажного) вагинального мазка: методика выполнения, показания и интерпретация

The International Society for the Study of Vulvovaginal Disease Vaginal Wet Mount Microscopy Guidelines: How to Perform, Applications, and Interpretation.

Журнал: Journal of Lower Genital Tract Disease | **Дата:** 01.04.2021 | **Доступ:** Закрытая

Описывает методику микроскопии нативного мазка и трактовку находок. При бактериальном вагинозе метод работает отлично, при трихомониазе и кандидозе непостоянно, а при аэробном вагините (десквамативном воспалительном вагините) служит эталонным; у бессимптомных женщин как скрининг он не рекомендован. Единая трактовка снижает частоту ошибочных диагнозов, избыточного и недостаточного лечения, а само исследование выполнимо на амбулаторном приёме.

Оригинал

Аннотация на русском

6. Одновременное лечение полового партнёра для профилактики рецидива бактериального вагиноза: обновление клинической практики Американской коллегии акушеров и гинекологов (ACOG)

Concurrent Sexual Partner Therapy to Prevent Bacterial Vaginosis Recurrence.

Журнал: Obstetrics and Gynecology | **Дата:** 01.12.2025 | **Доступ:** Закрытая

Формулирует позицию коллегии о лечении полового партнёра-мужчины при рецидивирующем течении, опираясь на новые данные о половой передаче. Точечно обновляет соответствующий раздел практического бюллетеня № 215.

Оригинал

Аннотация на русском

7. Лечение половых партнёров при бактериальном вагинозе у женщин: обновление рекомендаций Международного общества по изучению заболеваний вульвы и

влагалища (ISSVD)

Partner treatment in women with bacterial vaginosis: an update to the International Society for the Study of Vulvovaginal Disease (ISSVD) recommendations.

Журнал: Sexually Transmitted Infections | **Дата:** 25.02.2026 | **Доступ:** Закрытая

Формулирует позицию по лечению половых партнёров при рецидивирующем бактериальном вагинозе, то есть по вопросу, который годами оставался открытым и прямо влияет на тактику при частых рецидивах. Обновляет прежние рекомендации общества с учётом данных о половой передаче.

[Оригинал](#)

[Аннотация на русском](#)

8. Скрининг бактериального вагиноза у беременных для профилактики преждевременных родов: рекомендательное заявление Рабочей группы по профилактике заболеваний США (USPSTF)

Screening for Bacterial Vaginosis in Pregnant Persons to Prevent Preterm Delivery: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement.

Журнал: JAMA | **Дата:** 07.04.2020 | **Доступ:** Открытая

Закрывает вопрос о скрининге бессимптомного бактериального вагиноза при беременности. У женщин без повышенного риска преждевременных родов скрининг не рекомендован, поскольку чистой пользы нет, а при повышенном риске данных для вывода недостаточно.

[Оригинал](#)

[Аннотация на русском](#)

Переведем статью из этой подборки за 1 час

Загрузите PDF, а мы сделаем полный перевод, краткий конспект и красивую инфографику.

[Попробовать бесплатно →](#)

Также в Подтеме: еженедельные литобзоры и конспекты свежих мед. статей и подкастов каждый день.