

Скрининг рака шейки матки

Подборка ключевых международных клинических рекомендаций, гайдлайнов и консенсусов от ведущих врачебных обществ

Что изменилось за последние 5 лет

По действующим рекомендациям ВОЗ, Американского онкологического общества (ACS) и Европейского общества онкогинекологии (ESGO) первичное тестирование на ВПЧ вытесняет цитологию как самостоятельный метод, а интервал при отрицательном ВПЧ-тесте удлинняется до пяти лет и более. Консенсус Американского общества кольпоскопии и патологии шейки матки (ASCCP) 2019 года перевёл ведение аномальных результатов на принцип «равный риск, равное ведение», а обновления с расширенным генотипированием ВПЧ уточнили пороги для кольпоскопии и лечения. ВОЗ и ACS закрепили самозабор вагинального материала как валидный путь скрининга, что расширяет охват. Для цервикальной интраэпителиальной неоплазии 2 степени у молодых женщин консенсус Британского общества кольпоскопии (BSCCP) и ESGO 2025 года описал активное наблюдение как альтернативу немедленному лечению.

Гайдлайны и консенсусы

#	Статья	PMID	Источник	Дата	Доступ
1	Рекомендации ВОЗ по скринингу и лечению предраковых поражений шейки матки для профилактики рака шейки матки (второе издание)	34314129	Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)	2021	Открытая
2	Рекомендации ВОЗ по скринингу и лечению предраковых поражений шейки матки: применение генотипирования ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ)	42166609	Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)	2026	Открытая

#	Статья	PMID	Источник	Дата	Доступ
3	Скрининг рака шейки матки: рекомендательное заявление Рабочей группы по профилактике заболеваний США (USPSTF)	30140884	JAMA	август 2018	Открытая
4	Скрининг рака шейки матки: заявление комитета Американской коллегии акушеров и гинекологов (ACOG)	42024877	Obstetrics and Gynecology	24.04.2026	Открытая
5	Самостоятельно собранные вагинальные образцы для тестирования на ВПЧ и порядок завершения скрининга: обновление рекомендаций Американского онкологического общества (ACS)	41342729	CA: A Cancer Journal for Clinicians	январь 2026	Открытая
6	Позиция Европейского общества онкогинекологии (ESGO) и Европейской сети групп защиты интересов пациентов в гинекологии (ENGAGE) по риск-ориентированному скринингу рака шейки матки	42341405	International Journal of Gynecological Cancer	01.06.2026	Закрытая
7	Консенсусные рекомендации Американского общества кольпоскопии и патологии шейки матки (ASCCP) 2019 по ведению аномальных результатов скрининга рака шейки матки и предраковых состояний на основе оценки риска	32243307	Journal of Lower Genital Tract Disease	апрель 2020	Открытая
8	Применение расширенного генотипирования к ведению положительных результатов	39791481	Journal of Lower Genital Tract Disease	10.01.2025	Открытая

#	Статья	PMID	Источник	Дата	Доступ
	теста на ВПЧ шейки матки: Постоянные рекомендации				
9	Активное наблюдение при цервикальной интраэпителиальной неоплазии 2 степени: консенсус Британского общества кольпоскопии и патологии шейки матки и Европейского общества онкогинекологии (ESGO) 2025	40049205	The Lancet. Oncology	01.03.2025	Закрытая
10	Значение обеспечения качества кольпоскопии в элиминации рака шейки матки: позиционный документ Европейской федерации кольпоскопии (EFC)	42263348	European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology	07.06.2026	Открытая
11	Обновлённый обзор рекомендаций по скринингу рака шейки матки у женщин с иммуносупрессией без ВИЧ-инфекции	39804372	Journal of Lower Genital Tract Disease	13.01.2025	Открытая
12	Позиционное заявление Международной федерации гинекологии и акушерства (FIGO) об эффективности и безопасности вакцины против ВПЧ	40900298	International Journal of Gynaecology and Obstetrics: The Official Organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics	03.09.2025	Открытая

1. Рекомендации ВОЗ по скринингу и лечению предраковых поражений шейки матки для профилактики рака шейки матки (второе издание)

WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention

Издатель: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) | **Дата:** 2021 | **Доступ:** Открытая

Сдвигает скрининг к первичному ВПЧ-тестированию и определяет возраст начала и завершения, интервалы и ведение положительных результатов. 23 рекомендации и 7 положений о надлежащей практике, отдельно для общей популяции и для женщин с ВИЧ.

Оригинал

Аннотация на русском

2. Рекомендации ВОЗ по скринингу и лечению предраковых поражений шейки матки: применение генотипирования ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ)

WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention: Use of human papillomavirus (HPV) DNA genotyping

Издатель: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) | **Дата:** 2026 | **Доступ:** Открытая

Определяет роль ограниченного и расширенного генотипирования ВПЧ в стратификации риска и молекулярном триаже внутри скрининговых алгоритмов, с приоритетными стратегиями для разных уровней ресурсов.

Оригинал

Аннотация на русском

3. Скрининг рака шейки матки: рекомендательное заявление Рабочей группы по профилактике заболеваний США (USPSTF)

Screening for Cervical Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement.

Журнал: JAMA | **Дата:** август 2018 | **Доступ:** Открытая

Определяет возрастные границы и интервалы скрининга в США: цитология каждые 3 года в 21–65 лет либо тестирование на ВПЧ или ко-тест каждые 5 лет в 30–65 лет. Скрининг не начинают до 21 года и прекращают после 65 лет, если предшествующий скрининг был адекватным и женщина не относится к группе высокого риска.

Оригинал

Аннотация на русском

4. Скрининг рака шейки матки: заявление комитета Американской коллегии акушеров и гинекологов (ACOG)

Screening for Cervical Cancer.

Журнал: Obstetrics and Gynecology | **Дата:** 24.04.2026 | **Доступ:** Открытая

Одобрять с оговорками обновлённые рекомендации Инициативы по профилактической помощи женщинам (WPSI) 2026 года, прежде всего в части самозабора материала для первичного ВПЧ-тестирования. Разбирает практические стороны внедрения по возрастным группам у пациенток среднего риска.

Оригинал

Аннотация на русском

5. Самостоятельно собранные вагинальные образцы для тестирования на ВПЧ и порядок завершения скрининга: обновление рекомендаций Американского онкологического общества (ACS)

Self-collected vaginal specimens for human papillomavirus testing and guidance on screening exit: An update to the American Cancer Society cervical cancer screening guideline.

Журнал: CA: A Cancer Journal for Clinicians | **Дата:** январь 2026 | **Доступ:** Открытая

Признаёт самозабор приемлемым для первичного ВПЧ-скрининга у женщин среднего риска 25–65 лет, хотя забор материала врачом остаётся предпочтительным, и рекомендует повтор через 3 года после отрицательного результата. Ужесточает выход из скрининга: тесты в 60 и 65 лет, последний ВПЧ-тест не раньше 65 лет.

Оригинал

Аннотация на русском

6. Позиция Европейского общества онкогинекологии (ESGO) и Европейской сети групп защиты интересов пациентов в гинекологии (ENGAGE) по риск-ориентированному скринингу рака шейки матки

European Society of Gynaecological Oncology/European Network of Gynaecological Advocacy Groups Position on risk-based cervical cancer screening.

Журнал: International Journal of Gynecological Cancer | **Дата:** 01.06.2026 | **Доступ:** Закрытая

Обосновывает отказ от единой для всех схемы в пользу стратификации по риску: ВПЧ-ДНК первичным тестом, генотипирование вместе с возрастом и историей скрининга для индивидуальной оценки риска, удлинение интервалов у вакцинированных, самозабор для групп с низким охватом.

Оригинал

Аннотация на русском

7. Консенсусные рекомендации Американского общества кольпоскопии и патологии шейки матки (ASCCP) 2019 по ведению аномальных результатов скрининга рака шейки матки и предраковых состояний на основе оценки риска

2019 ASCCP Risk-Based Management Consensus Guidelines for Abnormal Cervical Cancer Screening Tests and Cancer Precursors.

Журнал: Journal of Lower Genital Tract Disease | **Дата:** апрель 2020 | **Доступ:** Открытая

Переводит ведение аномальных результатов на принцип «равный риск, равное ведение». Тактику (наблюдение, кольпоскопия, лечение) определяет не отдельный результат, а суммарный риск CIN3+ по совокупности текущих и прошлых данных: цитология, генотип ВПЧ, анамнез. Даёт единую систему порогов клинического действия.

Оригинал

Аннотация на русском

8. Применение расширенного генотипирования к ведению положительных результатов теста на ВПЧ шейки матки: Постоянные рекомендации

Applying Results of Extended Genotyping to Management of Positive Cervicovaginal Human Papillomavirus Test Results: Enduring Guidelines.

Журнал: Journal of Lower Genital Tract Disease | **Дата:** 10.01.2025 | **Доступ:** Открытая

Дифференцирует тактику по конкретному генотипу ВПЧ: при 16/18 сразу кольпоскопия, при 45, 33/58, 31, 52, 35/39/68 или 51 без 16 и 18 триаж цитологией или двойным окрашиванием, при 56/59/66 без других канцерогенных типов повтор ВПЧ-теста через год. Если по цитологии или гистологии уже есть изменения высокой степени или пациентку наблюдают после лечения CIN2+, ведение остаётся по рекомендациям ASCCP 2019 года.

[Оригинал](#)
[Аннотация на русском](#)

9. Активное наблюдение при цервикальной интраэпителиальной неоплазии 2 степени: консенсус Британского общества кольпоскопии и патологии шейки матки и Европейского общества онкогинекологии (ESGO) 2025

Active surveillance of cervical intraepithelial neoplasia grade 2: 2025 British Society of Colposcopy and Cervical Pathology and European Society of Gynaecologic Oncology consensus statement.

Журнал: The Lancet. Oncology | **Дата:** 01.03.2025 | **Доступ:** Закрытая

Определяет, у кого CIN2 можно вести наблюдением, а не немедленным иссечением. По накопленным данным спонтанно регрессирует 50–60% поражений, но при наблюдении кумулятивный риск инвазии выше, особенно после 30 лет. Отбор строится на возрасте, репродуктивных планах, дополнительных факторах риска и приверженности наблюдению.

[Оригинал](#)
[Аннотация на русском](#)

10. Значение обеспечения качества кольпоскопии в элиминации рака шейки матки: позиционный документ Европейской федерации кольпоскопии (EFC)

The importance of quality assurance in colposcopy in the elimination of cervical cancer: A position paper by the European Federation for Colposcopy.

Журнал: European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology | **Дата:** 07.06.2026 | **Доступ:** Открытая

Определяет критерии качества кольпоскопических служб: обученный персонал, согласованные протоколы, аудит и сравнение практики между центрами. Низкое качество служб связано с ростом риска как недолечивания, так и избыточного лечения, а сам документ намечает путь к выравниванию качества между странами Европы.

[Читать в Подтеме](#)
[Оригинал](#)
[Аннотация на русском](#)

11. Обновлённый обзор рекомендаций по скринингу рака шейки матки у женщин с иммуносупрессией без ВИЧ-инфекции

Updated Review for Guidelines for Cervical Cancer Screening in Immunosuppressed Women Without HIV Infection.

Журнал: Journal of Lower Genital Tract Disease | **Дата:** 13.01.2025 | **Доступ:** Открытая

Определяет, кому из женщин с иммуносупрессией без ВИЧ показан усиленный скрининг по протоколу для ВИЧ-положительных: после трансплантации органов, при терминальной почечной недостаточности, после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и при системной красной волчанке независимо от приёма иммуносупрессантов, а при воспалительных заболеваниях кишечника, ревматоидном артрите и рассеянном склерозе только на фоне иммуносупрессивной терапии. Отдельно уточняет схему вакцинации против ВПЧ.

[Оригинал](#)
[Аннотация на русском](#)

12. Позиционное заявление Международной федерации гинекологии и акушерства (FIGO) об эффективности и безопасности вакцины против ВПЧ

FIGO position statement on the effectiveness and safety of the HPV vaccine.

Журнал: International Journal of Gynaecology and Obstetrics: The Official Organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics | **Дата:** 03.09.2025 | **Доступ:** Открытая

Обосновывает вакцинацию против ВПЧ как первичную профилактику рака шейки матки: заболеваемость снижается при высоком охвате, безопасность подтверждена, а нежелательные явления обычно ограничены лёгкими местными реакциями. Однодозовые схемы получают всё больше поддержки, особенно при вакцинации в раннем возрасте.

[Оригинал](#)
[Аннотация на русском](#)

Переведем статью из этой подборки за 1 час

Загрузите PDF, а мы сделаем полный перевод, краткий конспект и красивую инфографику.

[Попробовать бесплатно →](#)

Также в Подтеме: еженедельные литобзоры и конспекты свежих мед. статей и подкастов каждый день.